

感染症の登園基準

病名	潜伏期間	感染可能期間	おもな症状	登園基準
インフルエンザ	1～2日	感染後約10日	発熱/全身倦怠/筋肉痛/鼻炎/咽頭熱/咳	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過
百日咳	6～15日	感染後約3週間	発作性咳の長期反復/持続	特有の咳が消失したとき
はしか(麻疹)	10～12日	発疹出現の前後4～5日	上気道のカタル/発熱/粘膜疹コブリック斑	発疹に伴う熱が下がった後、3日を経過し元気
おたふくかぜ	14～24日	7日前からその後9日	発熱/耳下腺/舌下腺/顎下線の腫脹及び圧痛	耳下腺の腫れが消失したとき
三日はしか	14～21日	発疹出現の前後7日間	種々の発疹/軽熱/リンパ腺腫大	発疹が消失したとき
水ぼうそう	11～20日	水疱発現前2～後6日	軽熱/被覆部に発疹/斑点丘疹状→水疱→顆粒状痂皮	すべての発疹が癒蓋になったとき
プール熱	5～6日	潜伏期後半～発症後約5日間	発熱/全身症状/咽頭炎と結膜炎の合併症	解熱し主要症状がなくなった後、2日を経過
流行性角結膜炎(はやり目)	1週間以上	発病後約2週間	軽熱/頭痛/全身倦怠/結膜の炎症/眼瞼浮腫/目やに	治癒するまで
急性出血性結膜炎(アポ口病)	1～2日	発病後約4日	涙/結膜充血/眼瞼浮腫/滲出液	治癒するまで
ヘルパンギーナ	2～7日		高熱/咽頭痛/咽頭に水疱	解熱し、食事也十分できて元気
手足口病	2～7日	水疱消滅まで	感冒様症状/手足口に赤斑→水疱	元気
りんご病(伝染性紅斑)	17～18日	14～20日	顔面赤斑とくに頬部の赤斑性発疹	元気(感染力はない病気)
溶連菌感染症	2～4日	潜伏期後半～発症後約7日間	発熱/咽頭痛/扁桃腺炎/菊舌/頸部リンパ節炎/全身に発疹	有効治療を始めてから2～3日
嘔吐下痢症		不定期	発熱/下痢/嘔吐	主治医が登園して差し支えないと認めたとき
感染性胃腸炎	1～3日		発熱/腹痛/下痢	主治医が登園して差し支えないと認めたとき
マイコプラズマ肺炎	10～24日		咳/発熱/呼吸困難(重症の場合)	症状が改善し元気
突発性発疹	約10日		高熱/3日後に全身に発疹	主治医が登園して差し支えないと認めたとき
ベルペス性歯肉口内炎	2日～2週間		口内炎症	症状が改善し元気
とびひ	2～10日	水疱消滅まで	主として豆つぶ大の水疱/自覚症状あまりなし	主治医が登園して差し支えないと認めたとき
水いぼ	14～50日		球状のいぼ	主治医が登園して差し支えないと認めたとき